AFTISÁN PLUS® Gel

FÓRMULA:

Fluocinolona Acetónido	0,075 g	Glicerina	
Lidocaína Clorhidrato	1,000 g	Metabisulfito de Sodio	
Clorhexidina Clorhidrato	0,020 g	Propilenglicol	
Alcohol	25,200 mL	Excipientes c.s.p.	100 g
Benzoato de Sodio			

ACCIÓN TERAPÉUTICA E INDICACIONES: Estomatitis aftosa recurrente.
ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Vía tópica bucal.
Adultos y niños: Colocar una o dos gotas de gel sobre la zona afectada por aftas, según el tamaño, dos veces al día. Directamente con el tubo o con ayuda de un algodón.
DURACIÓN DEL TRATAMIENTO: Según prescripción médica.
CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. Procesos tuberculosos en la zona de tratamiento.
EFECTOS ADVERSOS: En ocasiones algunas reacciones dérmicas.
Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso incluso si se trata de posible efecto adverso que no aparece en este folleto, usted puede comunicarlo al Centro de Farmacovigilancia a través de la página web: www.ifarbo.com, contribuyendo así a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.
PRECAUCIONES: Evitar el uso prolongado, principalmente en niños y en el primer trimestre del embarazo. Tomar en cuenta que el medicamento sólo contribuye al alivio de la sintomatología y a distanciar la recurrencia.
USO DURANTE EL EMBARAZO Y LACTANCIA: Solo bajo prescripción médica.
ADVERTENCIAS: Por contener alcohol, las aplicaciones frecuentes pueden producir irritación y sequedad de la piel. Por contener 2 mg de Benzoato de sodio/ 1 g de producto, puede irritar ligeramente los ojos, la piel y las mucosas. Puede aumentar el riesgo de coloración amarillenta de la piel (ictericia) en recién nacidos. Este medicamento contiene metabisulfito de sodio como excipiente por lo que puede causar reacciones de tipo alérgico, incluyendo reacciones anafilácticas y broncoespasmo en pacientes susceptibles, especialmente en aquellos con historial asmático o alérgico. Por su contenido de 24 mg de Propilenglicol/ 1g de producto, se deberá consultar al médico antes de su uso en niños menores de 4 semanas, en particular si está recibiendo otros medicamentos que contengan alcohol o propilenglicol.
"Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran".
INTERACCIONES: Sin interacciones importantes.
SOBREDOSIS: No se dan intoxicaciones en el uso tópico.
Conservar a temperaturas inferiores a 30 ºC, en lugar seco y protegido de la luz.
PRESENTACIÓN: Tubo por 5 g.

Elaborado por *"IFARBO" Ltda.* Industria Farmacéutica Certificada en *BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM).*

IFARBO LTDA. INDUSTRIA FARMACEUTICA BOLIVIANA
COCHABAMBA: c/ Caritas Nº 382 - Tel.: 4226001 Fax.: 4255407 Casilla 4437
SANTA CRUZ: Av. Landivar Nº 371 - Tel.: 3525783 Fax.: 3547598
LA PAZ: c/ Batallón Victoria Nº 300 - Tel.: 2280913 Fax.: 2280826
TARIJA: Av. 4 de Octubre Nº 1357 - Tel.: 6640645
Página web: www.ifarbo.com

TE-IDS049-08